

## 殺虫剤

# カスケード<sup>®</sup>乳剤

®=BASF社の登録商標

有効成分  
フルフェノクスロン ..... 10.0%  
補助成分  
メチルナフタレン(PRTR・1種) ..... 15.9%

登録番号：第18500号  
性 状：黄色澄明可乳化  
油状液体  
毒 性：普通物\*  
危 険 物：三石・非水溶性・Ⅲ  
有効年限：5年  
包 装：250ml×20本  
500ml×20本



\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用害虫と使用方法

(2018年9月12日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数				
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000~ 4000倍									
	ハマキムシ類	2000~ 6000倍									
	ヨモギエダシャク	4000倍									
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍		200~ 700ℓ /10a				収穫21日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	もも	ハダニ類									
ハマキムシ類		2000~ 4000倍									
小粒核果類	ハダニ類	2000倍		200~ 700ℓ /10a				収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	ネクタリン	ハマキムシ類									
おうとう		ハダニ類									
	モモハモグリガ	4000倍									
小粒核果類	ケムシ類	4000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	ハマキムシ類	4000倍									
ネクタリン	ハダニ類	2000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	ハマキムシ類	4000倍									
おうとう	ハダニ類	2000~ 4000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	モモハモグリガ	4000倍									

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヨモギエダシャク	4000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000～4000倍					
	ミカンハダニ	1000～2000倍					
かき	カキノヘタムシガ	4000倍		収穫14日前まで			
	カキクダアザミウマ	2000～4000倍		収穫3日前まで			
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍					
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ						
だいこん	アオムシ コナガ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
はつかだいこん	ハイマダラノメイガ				1回		1回
わさびだいこん	コナガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000倍			2回以内		2回以内
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	ハスモンヨトウ コナガ	4000倍			収穫7日前まで		2回以内
レタス 非結球レタス くきちしゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ				収穫3日前まで	3回以内	3回以内
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類				収穫前日まで	4回以内	散布
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～4000倍					
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数		
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a		2回以内	散布	2回以内		
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～ 4000倍							
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍							
なす	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍			4回以内		4回以内	3回以内	3回以内
	マメハモグリバエ ハダニ類	2000倍							
	カメムシ類	4000倍							
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	2000倍			3回以内		3回以内	3回以内	
ししとう	オオタバコガ	2000倍							
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000倍							
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	4000倍			収穫7日 前まで		2回以内	2回以内	2回以内
パセリ									
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ	4000倍			収穫14日 前まで		3回以内	3回以内	3回以内
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000倍			収穫7日 前まで 但し、伏せ 込み栽培 は伏せ込 み前まで		2回以内	2回以内	2回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000倍			収穫14日 前まで		3回以内	3回以内	3回以内
いちご	ハスモンヨトウ ミカンキイロアザミウマ	4000倍	収穫前日 まで	4回以内	4回以内	4回以内			
きゅうり	ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000倍							
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000～ 4000倍	収穫7日 前まで	3回以内	3回以内	3回以内			
	シロイチモジヨトウ	4000倍							
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍	収穫7日 前まで	3回以内	3回以内	3回以内			
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000倍							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
かぼちゃ	トマトハモグリバエ			収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
うり類 (漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	1回		1回	
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで				
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで	3回以内		3回以内	
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内	
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000倍						
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ	2000～4000倍					2回以内	2回以内
	オオタバコガ	4000倍						
てんさい	ヨトウムシ	2000～4000倍			収穫7日前まで		4回以内	4回以内
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000倍						
	ヨトウムシ	1000倍		25ℓ/10a				
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍		100～500ℓ/10a	収穫前日まで			
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～4000倍			収穫7日前まで		2回以内	2回以内
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000倍		100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ							
	マメハモグリバエ	2000倍						
さやいんげん	ハスモンヨトウ	4000倍			収穫前日まで	2回以内	2回以内	
	マメハモグリバエ	2000倍						
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000倍						
未成熟ささげ	ハスモンヨトウ							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	3000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000倍						
だいず	カメムシ類	32倍	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内	
あずき	ナミハダニ アズキノメイガ ハスモンヨトウ	4000倍						
みょうが(莖葉)	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 あっては開花期終了まで	3回以内	散布	3回以内	
みょうが(花穂)				収穫前日まで		散布、 但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する		
しそ(花穂)、 しそ科葉菜類 (バジルを除く)	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ							
にんじん	ヨトウムシ							
タラゴン	ハスモンヨトウ							
つるむらさき								
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ								
かんしょ				ハスモンヨトウ ナカジロシタバ				
食用トレニア	ハスモンヨトウ							
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ			2000倍				収穫3日前まで
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ			4000倍				収穫14日前まで

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで			
食用さくら (葉)	アザミウマ類	4000倍	200～ 700ℓ /10a				
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ	4000倍	200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで	2回以内		2回以内
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	-	3回以内	散布	3回以内
ばら	ハダニ類	1000倍					
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000倍					
スターチス	ハスモンヨトウ	2000倍					
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ						
宿根アスター	シロイチモジヨトウ	2000倍					
はぼたん	コナガ						
けいとう	シロオビノメイガ						
カーネーション ほおずき	タバコガ						
りんどう	リンドウホソハマキ	4000倍	100～ 700ℓ /10a				