

令和元年8月

# 適用拡大登録のご案内

脱皮阻害型殺虫剤



IPM防除体系に、難防除害虫対策に、広くご愛用いただいています IGR 剤・カスケード乳剤は、令和元年8月28日付けにて、下記の通り適用拡大登録されましたのでご案内申し上げます。幅広い適用作物・適用害虫のカスケード乳剤を上手に使って効率的な害虫防除にお役立てください。

## ■追加・変更部分の適用表(太字が適用拡大部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
<b>ぶどう</b>	<b>ハスモンヨトウ</b>	4000倍	200~700ℓ /10a	収穫 <b>30日前まで</b>	2回以内	散布	2回以内	
かき	<b>ケムシ類</b>			収穫 <b>14日前まで</b>				
キャベツ	<b>オオタバコガ</b>	2000~4000倍	100~300ℓ /10a	収穫 <b>7日前まで</b>				3回以内
ブロッコリー	<b>アオムシ</b> <b>アザミウマ類</b>							
だいず	<b>ハダニ類</b> <b>マメシンクイガ</b>							
あずき	<b>ハダニ類</b>							
いちご	<b>アザミウマ類</b>		収穫前日まで				3回以内	

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://agriculture.basf.com/jp>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

®=BASF社の登録商標