



畠作用除草剤

ゴードサン 乳剤 細粒剤F

®=BASF社の登録商標



幅広い適用雑草で、
イネ科・広葉雑草もまとめて防除！

1 風に強い細粒剤F
分散性が高く
小さくて重いので、
風に強く比較的の日を
選ばず散布できます。

2 幅広い適用雑草
土壌処理で
イネ科・広葉雑草
を同時に防除

3 40~60日の
効果持続性
雑草の発生を
40~60日の
長期間抑制可能



ナズナ




スズメノカタビラ



イヌビエ



イヌビユ



ハコベ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壤	10アール当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンティメタリンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
はくさい		定植前(雑草発生前)	壤土～埴土	200～300ml				1回
キャベツ、カリフラワー レタス、青結球レタス		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)		200～400ml	70～150ℓ		全面土壤散布	全 域
う ど		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し収穫60日前まで		400ml	100ℓ		畦間土壤散布	2回以内(畦間処理は1回以内)
たまねぎ(直播栽培)		は種後～本葉2葉期(雑草発生前)		200～400ml	70～100ℓ			
たまねぎ(移植栽培)		定植前(雑草発生前)	全土壤	300～500ml	70～150ℓ		全面土壤散布	
葉たまねぎ		定植後(雑草発生前)但し収穫30日前まで		200～300ml	70～100ℓ			
らっきょう		植付後萌芽前(雑草発生前)		300～500ml	70～150ℓ		全面土壤散布	
ね ぎ		定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで		200～300ml	100ℓ		畦間土壤散布	
に ら		収穫30日前まで(雑草発生前)		300～500ml	70～150ℓ			
にんにく		植付前(マルチ前)		300～500ml	70～100ℓ			
葉にんにく(マルチ栽培)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	壤土～埴土	400～500ml	70～150ℓ		全面土壤散布	全 域
葉にんにく(マルチ栽培を除く)		植付前		300～400ml	100ℓ			
ふき(春どり露地栽培)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで		400ml	70～150ℓ			
ふき(ふきのとう)		春期収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	全土壤	200～400ml	100ℓ		畦間土壤散布	1回
かんしょ		春期ふき収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)		200～300ml	70～100ℓ			
さといも		播種10日後まで(雑草発生前)		200～400ml	70～150ℓ			
ばれいしょ		植付後萌芽前(雑草発生前)		200～300ml	100ℓ			
やまのいも		植付後又は培土後(雑草発生前)但し植付30日後まで		200～400ml	70～100ℓ		全面土壤散布	北海道、九州を除く全域
しょうが		は種後出芽前(雑草発生前)		200～400ml	70～150ℓ			
こんにゃく		は種後(雑草発生前)～小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)	砂壤土～埴土	300～500ml	70～100ℓ		全面土壤散布	関東以西
らっかせい		ソルガム3葉期(雑草発生前～発生始期)		300ml	70～150ℓ			全 域
にんじん、とうもろこし 飼料用とうもろこし		は種後出芽前(雑草発生前)		300～400ml	100ℓ		北海道を除く全域	
陸稻		萌芽前(雑草発生前)		200～400ml	70～150ℓ			
麦類(小麦を除く)		生育期(雑草発生前)但し収穫90日前まで		200～400ml	100ℓ			
小 麦		春期芽前又は夏切後(雑草発生前)	全土壤	300～400ml	100～200ℓ	2回以内	全面土壤散布	全 域
ソルガム		植付後萌芽前(雑草発生前)		300～500ml	70～150ℓ	3回以内 (1年間に1回以内)		
アスパラガス		定植前(雑草発生前)		200～400ml	100～200ℓ			
とりかぶと(薬用)		定植後(雑草発生前)		200～400ml	70～150ℓ			
食用ざく		萌芽前(雑草発生前)		300～500ml	100ℓ			
きく		定植前(雑草発生前)		300～400ml	70～150ℓ			
りんどう		定植後(雑草発生前)		300～500ml	100～200ℓ	1回		2回以内
チューリップ		萌芽前(雑草発生前)		300ml	70～150ℓ			3回以内 (1年間に1回以内)
桑		植付後萌芽前(雑草発生前)		300～500ml	100ℓ			
おけら		春期芽前又は夏切後(雑草発生前)		200～400ml	70～150ℓ			
すぎ(床替床)、ひのき(床替床)		収穫60日前まで(雑草発生前)		300～400ml	100～200ℓ			
せんきゅう		床替後(雑草発生前)		200～300ml	70～150ℓ			
みしまさいこ、ぼうふう、びゃくし		萌芽後(雑草発生前)但し収穫120日前まで		400～500ml	100～200ℓ			
とうき、いんちんこう		は種後出芽前(雑草発生前)		300ml	70～150ℓ			
		定植後(雑草発生前)但し収穫120日前まで		300ml	100ℓ			

ゴーフーサン® 細粒剤F

*本剤およびペンディメタリンを含む農薬の総使用回数

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壤	10アール当り使用量	総使用回数*	使用方法	適用地帯					
麦類、とうもろこし、飼料用とうもろこし	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土～埴土	5～6kg	1回	全面土壤散布	全域					
陸稻、ソルガム				4～6kg			関東以西					
にんじん				4～5kg			全域					
らっかせい				5kg			全域(北海道を除く)					
さといも		植付前(雑草発生前)	全土壤	4～6kg			全域					
ばれいしょ(マルチ栽培を除く)		植付後萌芽前(雑草発生前)	砂壤土～埴土				全域(北海道を除く)					
ばれいしょ(マルチ栽培)		植付後マルチ前、但し、萌芽前まで(雑草発生前)					全域					
キャベツ		定植前又は定植後～定植翌日(雑草発生前)	4～5kg	全域(北海道を除く)								
はくさい、レタス、非球根レタス		定植前(雑草発生前)	全土壤	4～6kg			全域					
アスパラガス		萌芽前(雑草発生前)					全域					
にんにく		植付前(マルチ前)					全域					
たまねぎ(春播栽培)		植付後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで	砂壤土～埴土				全域					
たまねぎ(秋播栽培)		定植後(雑草発生前)但し、収穫30日前まで	5～6kg				全域(北海道、九州を除く)					
たまねぎ(秋播マルチ栽培)		定植後又は生育期(雑草発生前)但し、収穫30日前まで					全域					
ねぎ		定植前(マルチ前)					全域					
しょうが		定植後(雑草発生前)但し、定植10日後まで	全土壤	4～6kg	2回以内	全面土壤散布	全域					
こんにゃく		植付後萌芽前(雑草発生前)		5～6kg			全域					
桑		植付後又は培土後(雑草発生前)但し、植付30日後まで		5kg			全域					
バセリ		春期発芽前又は夏切り後(雑草発生前)		3～5kg			全域					
みしまさいご		は種後出芽前(雑草発生前)	壤土～埴壤土	3～5kg	1回	全面土壤散布	全域					
チューリップ		は種後～発芽期又は萌芽期(雑草発生始期まで)	砂壤土～埴土	4～6kg			全域					
つづじ類		植付後萌芽前(雑草発生前)	全土壤	4～6kg			全域					
きく		生育期(雑草発生前)										
		定植後(雑草発生前)										

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器は園場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVAL日本橋ビル3階
0120-014-660 <https://agriculture.bASF.com/ip>

取扱い

この資料の記載内容は2019年2月現在の登録内容です。