

殺虫剤

コデツ[®]フロアブル

殺虫剤分類 **13**

有効成分

クロルフェナピル 10.0%

登録番号：第19184号

性 状：類白色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：医薬用外劇物

有効年限：5年

包 装：(250ml×20本)×2箱
500ml×20本



■適用害虫と使用方法

(2019年10月9日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピルを含む農薬の 総使用回数
りんご	キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	ヨモギエダシャク リンゴサビダニ	2000～ 4000倍					
もも	ミカンキイロアザミウマ	2000倍		収穫7日 前まで			
	モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ						
ネクタリン	ミカンキイロアザミウマ	2000～ 4000倍		収穫60日 前まで			
おうとう	ナミハダニ カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ オウトウショウジョウバエ	2000倍					
	ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ	2000～ 4000倍	2000倍			
ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ コガネムシ類 ミノガ類 ブドウハモグリダニ							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピ ルを含む農薬の 総使用回数					
かき	カキクダアザミウマ ナミハダニ カンザワハダニ イラガ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内					
	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ	2000～ 4000倍										
	カキサビダニ	4000倍										
なし	ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ	2000～ 3000倍		200～ 700ℓ /10a			3回以内	散布	3回以内			
	ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ	2000倍										
かんきつ	ヨモギエダシャク	2000～ 4000倍			200～ 700ℓ /10a		収穫前日 まで		2回以内	散布	2回以内	
	アザミウマ類 (ネギアザミウマを除く)	2000～ 6000倍										
	チャノホコリダニ ミカンサビダニ	4000～ 6000倍										
	ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カネタタキ スグリゾウムシ	4000倍										
いちじく	ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ	2000倍					200～ 700ℓ /10a		収穫14日 前まで		散布	3回以内
小粒核果類	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ											
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ											
マンゴー	チャノキイロアザミウマ											
ゴレンシ	カンザワハダニ											
ブルーベリー	イラガ類		収穫前日 まで			3回以内						
あずき	ハダニ類 ノメイガ類		2000倍			100～ 300ℓ /10a			収穫3日 前まで			
豆類(未成熟、 但し、さやいんげ ん、さやえんどう、 実えんどうを除く)	ハダニ類			2回以内								
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ											
実えんどう さやえんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ											
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ				3回以内			3回以内				

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
うり類 (漬物用)	ミナミキイロアザミウマ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
すいか	ミナミキイロアザミウマ	4000倍					
	ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ						
にがうり かぼちゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ						
トマト ミニトマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ						
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類	2000倍					
	ピーマン とうがらし類 (ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類					
ししとう	ヒラズハナアザミウマ	4000倍					
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ						
	ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ					
茎ブロッコリー	アオムシ	2000倍					
カリフラワー	コナガ						
メキャベツ 非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ						
なばな							
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数								
非結球 あぶらな科 葉菜類 (こまつな、ひろしま な、チンゲンサイ、さ んとうさいを除く)	コナガ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	1回	散布	1回								
チンゲンサイ				収穫7日 前まで											
さんとうさい				収穫3日 前まで											
こまつな	アオムシ コナガ ハクサイダニ			ひろしまな	アオムシ コナガ	だいこん	アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ	かぶ	コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ	みょうが (花穂)	ハダニ類	収穫前日 まで	2回以内	散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する	2回以内
みょうが (茎葉)	みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで														
いちご	ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ			収穫前日 まで	散布										
ねぎ	シロイチモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ			収穫7日 前まで											
オクラ	ハスモンヨトウ オオタバコガ			収穫前日 まで											

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェニルを含む農薬の総使用回数	
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	
モロヘイヤ	アザミウマ類			収穫7日 前まで	1回		1回	
あしたば	ウドノメイガ			収穫前日 まで	2回以内		2回以内	
やまのいも	カンザワハダニ ナガイモコガ			収穫3日 前まで				
やまのいも (むかご)								
かんしょ	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内		散布	2回以内
	ヨツモンカメノコハムシ							
はすいも (葉柄)	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内		散布	2回以内
さといも				収穫3日 前まで				
さといも (葉柄)								
アスパラガス	ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ジュウシホシクビナガハムシ ヨトウムシ	2000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	
ふき	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
ふき (ふきのとう)				収穫90日 前まで				
てんさい	ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
セルリー	ヨトウムシ		収穫14日 前まで					
にんじん	ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	
みつば	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで 但し、伏せ 込み栽培は 伏せ込み前 まで				1回
みしまさいこ				収穫21日 前まで	2回以内	2回以内		

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数				
エンサイ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内				
コリアンダー(葉) やなぎたで				収穫7日前まで				1回	1回		
つるむらさき				収穫14日前まで	2回以内		2回以内				
しゅんぎく								収穫前日まで			
しょうが				収穫7日前まで	3回以内		3回以内				
葉ごぼう				収穫前日まで	2回以内		2回以内				
すいぜんじな	ハダニ類 ヨトウムシ			2000倍	100～300ℓ/10a		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
よもぎ	ミナミキイロアザミウマ						収穫3日前まで	1回		1回	
葉にんにく	ハダニ類						収穫14日前まで	2回以内		2回以内	
つわぶきとうき							収穫前日まで				
せんきゅう							収穫90日前まで	3回以内		3回以内	
たらのき							親株養成期 但し、 収穫90日前まで				
はまぼうふう(葉)		シクラメンホコリダニ	根株養成期 但し、 収穫75日前まで			2回以内	2回以内				
うど			2葉期まで 但し、 収穫14日前まで			1回	1回				
ほうれんそう	ハウレンソウケナガコナダニ	4000～6000倍	200～700ℓ/10a			収穫7日前まで	2回以内	散布		2回以内	
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	4000倍				収穫前日まで					
とうもろこし ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ	2000倍				100～300ℓ/10a	収穫14日前まで			2回以内	2回以内
食用プリムラ	ハスモンヨトウ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ						2000倍				

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
食用ミニバラ				収穫3日 前まで			
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ シャクトリムシ類 チャノココクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ		200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで			
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類		100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで			
きく(葉)	オオタバコガ		100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで			
きく	アワダチソウグンバイ						
ストック	コナガ アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		150～ 300ℓ /10a	発生初期			
花き類・ 観葉植物 (きく、ストック を除く)	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		150～ 300ℓ /10a	発生初期			
しきみ	クスアナアキゾウムシ		200～ 700ℓ /10a				
アザレア	チャノホコリダニ		100～ 300ℓ /10a				
なんてん(葉)	アザミウマ類	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで				

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラ ス室等密閉 できる場所	ミカンキイロアザミウマ	300mℓ /10a	10ℓ/ 10a	収穫前日 まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
ぶどう		チャノキイロアザミウマ	150mℓ /10a	6ℓ/ 10a	収穫14日 前まで			