


## 殺菌剤

# ストロビー<sup>®</sup>フロアブル

®=BASF社の登録商標



有効成分  
クレソキシムメチル  
(PRTR・1種) ..... 44.2%

登録番号：第21987号  
性 状：類白色水和性  
粘稠懸濁液体  
毒 性：普通物\*  
有効年限：4年  
包 装：500ml×20本  
1ℓ×12本

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用病害と使用方法

(2018年1月17日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数	
麦類 (小麦を除く)	うどんこ病 赤かび病 赤さび病	2000~ 3000倍	60~ 150ℓ /10a	収穫14日前まで				
小麦	赤かび病	500倍	25ℓ /10a					
やまのいも	葉渋病	2000~ 3000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
やまのいも (むかご)		2000倍						
きゅうり	うどんこ病 べと病 褐斑病 炭疽病	3000倍	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで		散布		
きゅうり(花)	うどんこ病 べと病 褐斑病			収穫3日前まで				2回以内
すいか	炭疽病 つる枯病 うどんこ病	2000~ 3000倍		収穫前日まで				3回以内
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病							
かぼちゃ	べと病 うどんこ病	3000倍		収穫7日前まで				
にがうり								

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	3000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
ズッキーニ	うどんこ病			収穫前日まで			
なす	うどんこ病 すすかび病						
ピーマン	うどんこ病 黒枯病	4000倍		2回以内	2回以内		
とうがらし類 (ししとうを除く)	うどんこ病						
ししとう	うどんこ病 黒枯病	3000倍		3回以内	3回以内		
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病						
たかな たいさい	白斑病						
なばな	白さび病	3000～ 4000倍		2回以内	2回以内		
すいぜんじな	黒斑病	3000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
タアサイ	白さび病			収穫前日まで			
のざわな	べと病			収穫14日前まで			
サラダ菜	褐斑病			収穫3日前まで			
おおさきな	黒斑病		2回以内				
いちご	うどんこ病	3000～ 5000倍	2回以内	2回以内			
にら にら(花茎)	さび病 白斑葉枯病	3000倍	3回以内	3回以内			
ねぎ	黒斑病 さび病 黄斑病	2000倍	2回以内	2回以内			
わけぎ	灰色かび病	3000倍	2回以内	3回以内	3回以内		
たまねぎ		2000～ 3000倍	収穫14日前まで				
にんにく	さび病	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
葉にんにく			収穫14日前まで				
らっきょう	乾腐病	200倍	－	植付前	1回	30分間 種球浸漬	1回
にんじん	黒葉枯病	2000～ 3000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	斑点病	3000倍					

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数
てんさい	葉腐病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
	褐斑病	2000～3000倍		収穫75日前まで			
たらのき	そうか病	2000倍	100～500ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
アスパラガス	斑点病			収穫7日前まで			
食用ゆり	葉枯病	3000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内		1回
パセリ	うどんこ病			炭疽病			収穫7日前まで
しゅんぎく	炭疽病	4000倍	100～300ℓ/10a		2回以内		
しそ科葉菜類(しそを除く)	灰色かび病			3000倍			100～300ℓ/10a
しそ	斑点病	4000倍	100～300ℓ/10a		2回以内		
	セルリー			斑点病			収穫前日まで
チャービル ディル(葉)	うどんこ病	3000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
さやえんどう 実えんどう	さび病			収穫前日まで			2回以内
茶	もち病 網もち病	2000倍	200～400ℓ/10a	摘採10日前まで	3回以内	3回以内	
	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症	2000～3000倍					
食用金魚草	さび病	3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
食用トレニア	うどんこ病	4000倍		収穫3日前まで			
食用パンジー				収穫7日前まで			
食用西洋たんぽぽ				収穫45日前まで			
食用かえで(葉)				収穫3日前まで			
食用ぎく	白さび病 黒斑病 褐斑病	3000倍		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内
きく(葉)							
きく	2000～3000倍	3000倍		100～300ℓ/10a	発病初期	3回以内	3回以内
アスター			さび病				
りんどう	黒斑病 褐斑病	2000倍	100～700ℓ/10a	発病初期	3回以内	3回以内	