

令和3年4月
農林水産省登録
第22176号

適用拡大登録のご案内

除草剤 ゴーゴーサン乳剤 ペンディメタリン乳剤

- 令和3年4月21日付けで、以下のとおり適用拡大登録されました。
- ・適用内容のうち、適用土壌および適用地帯の区分が削除されました。
 - ・作物名「ぼうふう」が「とうすけぼうふう」に変更登録されました。

【変更後の適用内容】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数		
			薬量	希釈水量					
陸稲	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	200~400 mℓ / 10a	70~150 ℓ / 10a	1回	全面土壌 散布	1回		
麦類 (小麦を除く)		は種後(雑草発生前) ~小麦2葉期 (イネ雑草1葉期まで)	300~500 mℓ / 10a	70~100 ℓ / 10a					
小麦			ソルガム3葉期 (雑草発生前~発生始期)					300 mℓ / 10a	
ソルガム		は種後出芽前 (雑草発生前)	300~400 mℓ / 10a	70~150 ℓ / 10a		全面土壌 散布			
とうもろこし 飼料用とうもろこし		挿苗10日後まで (雑草発生前)	200~400 mℓ / 10a	100 ℓ / 10a		畦間土壌 散布			
ヤングコーン			植付後萌芽前 (雑草発生前)	70~100 ℓ / 10a		全面土壌 散布			
かんしょ		土寄せ後 (雑草発生前) 但し、収穫60日前まで		100 ℓ / 10a				2回以内(土寄せ後の処理は1回以内)	
さといも		は種後出芽前 (雑草発生前)	200~300 mℓ / 10a	70~100 ℓ / 10a		1回		全面土壌 散布	1回
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	200~400 mℓ / 10a	100ℓ / 10a					
やまのいも			植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し、植付30日後まで	200~300 mℓ / 10a					
こんにゃく		定植前 (雑草発生前)	200~400 mℓ / 10a	70~150 ℓ / 10a					
はくさい			定植後萌芽前(根株養成圃) (雑草発生前)	400 mℓ / 10a				100 ℓ / 10a	
キャベツ		生育期 (根株養成圃) (雑草発生前) 但し、収穫60日前まで							
カリフラワー		定植後萌芽前(根株養成圃) (雑草発生前)	400 mℓ / 10a	100 ℓ / 10a				畦間土壌 散布	
レタス									
非球レタス	定植後萌芽前(根株養成圃) (雑草発生前)	400 mℓ / 10a	100 ℓ / 10a	畦間土壌 散布					
うど					生育期 (根株養成圃) (雑草発生前) 但し、収穫60日前まで		2回以内 (畦間処理は1回以内)		

以降につづく

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

適用拡大登録のご案内

令和3年4月
農林水産省登録
第22176号

【変更後の適用内容】 つづき

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	ベンディメタリンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
たまねぎ (直播栽培)	一年生 雑草	は種後～本葉2葉期 (雑草発生前)	200～400 mℓ /10a	70～100 ℓ /10a	1回	全面土壌 散布	1回
たまねぎ (移植栽培)		定植前 (雑草発生前)	300～500 mℓ /10a	70～150 ℓ /10a			
		定植後 (雑草発生前) 但し 収穫30日前まで					
葉たまねぎ		定植前 (雑草発生前)					
らっきょう		植付後萌芽前 (雑草発生前)					
ねぎ		定植後 (雑草発生前) 但し 定植10日後まで	200～300 mℓ /10a	70～100 ℓ /10a			
にら		収穫30日前まで (雑草発生前)	300～500 mℓ /10a	100 ℓ /10a		全面土壌 散布	
		植付前 (マルチ前)		70～150 ℓ /10a			
にんにく		植付後 (雑草発生前) 但し 収穫60日前まで	400～500 mℓ /10a	70～100 ℓ /10a			
		植付前 (マルチ前)		70～150 ℓ /10a			
葉にんにく (マルチ栽培)		植付前	300～400 mℓ /10a	70～150 ℓ /10a			
葉にんにく (マルチ栽培を 除く)		植付後 (雑草発生前) 但し 収穫60日前まで		100 ℓ /10a			
らっかせい		は種後出芽前 (雑草発生前)	200～300 mℓ /10a	70～150 ℓ /10a		全面土壌 散布	
にんじん		萌芽前 (雑草発生前)	200～400 mℓ /10a				
アスパラガス							
しょうが		植付後萌芽前 (雑草発生前)					
ふき (春どり露地栽培)		春期収穫直後 から萌芽前まで (雑草発生前)	400 mℓ /10a				
		ふき (ふきのとう)					
とりかぶと (薬用)	生育期 (雑草発生前) 但し 収穫90日前まで	300～500 mℓ /10a	100 ℓ /10a				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを送付しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

適用拡大登録のご案内

令和3年4月
農林水産省登録
第22176号

【変更後の適用内容】 つづき

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメリンを含む農薬の総使用回数
			葉量	希釈水量			
おけら	一年生雑草	収穫60日前まで (雑草発生前)	200~300 mL /10a	70~150 L /10a	3回以内 (1年間に 1回以内)	全面土壌 散布	3回以内 (1年間に 1回以内)
みしまさいこ とうすげぼうふう びやくし		は種後出芽前 (雑草発生前)	300 mL /10a				
せんきゆう		萌芽後 (雑草発生前) 但し 収穫120日前まで		100 L /10a			
とうき いんちんこう		定植後 (雑草発生前) 但し 収穫120日前まで	200~400 mL /10a				
食用ぎく		定植前 (雑草発生前)		70~150 L /10a			
きく		定植後 (雑草発生前)	300~500 mL /10a				
りんどう		萌芽前 (雑草発生前)		400~500 mL /10a			
チューリップ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	300~400 mL /10a				
すぎ(床替床) ひのき(床替床)		床替後 (雑草発生前)		100~200 L /10a			
桑		春期発芽前又は夏切後 (雑草発生前)	2回以内				

* 使用上の注意事項が追加されました。

(追加事項)

- > 砂土では使用しないこと。
- > たまねぎの直播栽培では薬害を生じるおそれがあるので、初めて使用する場合は事前に薬害の有無を十分に確認してから使用することとし、は種深度は2cm以上とすること。
- > たまねぎの秋播の直播栽培では、処理後に低温が続く条件では生育抑制等の薬害を生じるおそれがあるので、たまねぎの1~2葉期に使用すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。