

殺虫剤

アックス®

フロアブル

®=BASF社の登録商標

殺虫剤分類 **2B**

有効成分

フィプロニル(PRTR・1種) 5.0%

登録番号：第21719号

性 状：淡黄色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：医薬用外劇物

有効年限：3年

包 装：250ml×20本



■適用害虫と使用方法

(2021年5月26日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フィプロニルを含む農薬の総使用回数
なたね	コナガ	3000倍	100~300ℓ /10a	収穫14日前 まで		散布	1回
キャベツ	ハイマダラノメイガ コナガ	100倍	セル成型育苗 トレイ1箱 またはペーパー ポット1冊 (30×60cm、 使用土壌 約3~4ℓ) 当り0.5ℓ	定植前まで	1回	灌注	3回以内 (定植前の 処理は 1回以内、 定植後の 散布は 2回以内)
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ タマナギンウワバ オオタバコガ キスジノミハムシ	2000倍	100~300ℓ /10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フィプロニルを含む農薬の総使用回数
はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ	100倍	セル成型育苗 トレイ1箱 またはペーパー ポット1冊 (30×60cm、 使用土壌 約3~4ℓ) 当り0.5ℓ	定植前まで	1回	灌注	3回以内 (定植前の 処理は 1回以内、 定植後の 散布は 2回以内)
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ キスジノミハムシ タマナギンウワバ オオタバコガ	2000倍	100~300ℓ /10a	収穫21日前 まで	2回以内	散布	
	チンゲンサイ			コナガ			
カリフラワー				収穫14日前 まで			
ブロッコリー	コナガ ハイマダラノメイガ	100倍	セル成型育苗 トレイ1箱 またはペーパー ポット1冊 (30×60cm、 使用土壌 約3~4ℓ) 当り0.5ℓ	定植前まで	1回	灌注	3回以内 (定植前の 処理は 1回以内、 定植後の散布 は2回以内)
		2000倍	100~300ℓ /10a	収穫30日前 まで	2回以内	散布	
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ			収穫14日前 まで			
てんさい	テンサイトビハムシ	50倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ (3ℓ/m ²)	定植前まで	1回	苗床 灌注	1回
ストック	コナガ	2000倍	100~300ℓ /10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
きく カーネーション	アザミウマ類 オオタバコガ						
ばら	ミカンキイロアザミウマ チュウレンジハバチ						