


畑作用除草剤

ゴゴサン[®] 乳剤 細粒剤F

©=BASF社の登録商標



幅広い適用雑草で、
イネ科・広葉雑草もまとめて防除！

1

風に強い細粒剤F
分散性が高く
小さくて重いので、
風に強く比較的日を選ばず散布できます。

2

幅広い適用雑草
土壌処理で
イネ科・広葉雑草
を同時に防除

3

**40~60日の
効果持続性**
雑草の発生を
40~60日の
長期間抑制可能



ナズナ



スズメノカタビラ



イヌビエ



イヌビユ



ハコベ

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
			薬量(mL)	希釈水量(L)			
はくさい		定植前(雑草発生前)	200~300	70~150	1回	全面土壌散布	1回
キャベツ、カリフラワー、レタス、非結球レタス		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	200~400	70~150			
うど		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し収穫60日前まで	400	100	1回	畦間土壌散布	2回以内 (畦間処理は1回以内)
たまねぎ(直播栽培)		は種後~本葉2葉期(雑草発生前)	200~400	70~100			
たまねぎ(移植栽培)		定植前(雑草発生前)	300~500	70~150	1回	全面土壌散布	1回
葉たまねぎ		定植後(雑草発生前)但し収穫30日前まで					
らっきょう		定植前(雑草発生前)	200~300	70~100	1回	畦間土壌散布	1回
ねぎ		植付後萌芽前(雑草発生前)					
にら		定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで	300~500	70~150	1回	全面土壌散布	1回
にんにく		収穫30日前まで(雑草発生前)					
葉にんにく(マルチ栽培)		植付前(マルチ前)	400~500	70~150	1回	全面土壌散布	1回
葉にんにく(マルチ栽培を除く)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで					
ふき(春どり露地栽培)		春期収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	400	70~150	1回	畦間土壌散布	2回以内 (土寄せ後の処理は1回以内)
ふき(ふきのとう)		春期ふき収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)					
かんしょ		挿苗10日後まで(雑草発生前)	200~400	70~100	1回	全面土壌散布	1回
さといも		植付後萌芽前(雑草発生前)					
ばれいしょ		土寄せ後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	200~300	70~100	1回	全面土壌散布	1回
やまのいも		植付後萌芽前(雑草発生前)					
しょうが		植付後又は培土後(雑草発生前)但し植付30日後まで	200~400	70~150	1回	全面土壌散布	1回
こんにゃく		植付後又は培土後(雑草発生前)但し植付30日後まで					
らっかせい		は種後出芽前(雑草発生前)	200~400	70~150	1回	全面土壌散布	1回
にんじん、とうもろこし、飼料用とうもろこし		は種後(雑草発生前)~小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)					
ヤングコーン		ソルガム3葉期(雑草発生前~発生初期)	300~500	70~100	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	1回
陸稲		ソルガム3葉期(雑草発生前~発生初期)					
麦類(小麦を除く)		は種後出芽前(雑草発生前)	300	70~150	1回	全面土壌散布	1回
小麦		は種後(雑草発生前)~小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)					
ソルガム		萌芽前(雑草発生前)	200~400	70~150	1回	全面土壌散布	1回
アスパラガス		萌芽前(雑草発生前)					
とりかぶと(薬用)		生育期(雑草発生前)但し収穫90日前まで	300~500	100	1回	全面土壌散布	1回
食用ぎく		生育期(雑草発生前)但し収穫90日前まで					
きく		定植前(雑草発生前)	200~400	70~150	1回	全面土壌散布	1回
りんどう		定植後(雑草発生前)					
チューリップ		萌芽前(雑草発生前)	300~500	100~200	2回以内	全面土壌散布	2回以内
桑		植付後萌芽前(雑草発生前)					
おけら		春期発芽前又は夏切後(雑草発生前)	300~400	70~150	3回以内 (1年間に1回以内)	全面土壌散布	3回以内 (1年間に1回以内)
すぎ(床替床)、ひのき(床替床)		収穫60日前まで(雑草発生前)					
せんきゅう		床替後(雑草発生前)	400~500	100~200	1回	全面土壌散布	1回
みしまさいこ、とうすけぼうふう、びやくし		萌芽後(雑草発生前)但し収穫120日前まで					
とうき、いんちんこう		は種後出芽前(雑草発生前)	300	70~150	1回	全面土壌散布	1回
		定植後(雑草発生前)但し収穫120日前まで					

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10a当り使用量(kg)	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
ヤングコーン		は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	4~6				
陸稲、ソルガム		は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	4~5	1回	全面土壌散布	1回	
にんじん		は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	5				
らっかせい		は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	5	1回	全面土壌散布	1回	
さといも		は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	5				
ばれいしょ(マルチ栽培を除く)		植付前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	4~6	1回	全面土壌散布	1回	
ばれいしょ(マルチ栽培)		植付後萌芽前(雑草発生前)						
キャベツ		植付後萌芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	4~6	1回	全面土壌散布	1回	
はくさい、レタス、非結球レタス		土寄せ後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで						
アスパラガス		定植前又は定植後~定植翌日(雑草発生前)	全土壌	4~6	1回	全面土壌散布	1回	
にんにく、葉にんにく		定植前(雑草発生前)						
たまねぎ(春播栽培)		萌芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	5~6	1回	全面土壌散布	1回	
たまねぎ(秋播栽培)		萌芽前(雑草発生前)						
たまねぎ(秋播マルチ栽培)		植付前(マルチ前)	全土壌 砂壤土~粘土	4~6	1回	全面土壌散布	1回	
葉たまねぎ		定植前(マルチ前)						
ねぎ		定植後(雑草発生前)但し、定植10日後まで	全土壌	5~6	1回	全面土壌散布	1回	
こんにゃく		定植後(雑草発生前)但し、定植10日後まで						
桑		植付後又は培土後(雑草発生前)但し、植付30日後まで	全土壌	5~6	1回	全面土壌散布	1回	
パセリ		植付後又は培土後(雑草発生前)但し、植付30日後まで						
みしまさいこ		春期発芽前又は夏切り後(雑草発生前)	壤土~埴壤土	3~5	2回以内	全面土壌散布	2回以内	
チューリップ		は種後出芽前(雑草発生前)						
つつじ類		は種後出芽前(雑草発生前)	砂壤土~粘土	4~6	1回	全面土壌散布	1回	
しょうが		は種後~発芽期又は萌芽期(雑草発生初期まで)						
きく		植付後萌芽前(雑草発生前)	全土壌	4	1回	全面土壌散布	1回	
いくざ		生育期(雑草発生前)						
		植付後萌芽前(雑草発生前)	全土壌	4	1回	全面土壌散布	1回	
		定植後(雑草発生前)						
		畑床での定植後(雑草発生前)(入水15日前まで)	全土壌	4	1回	全面土壌散布	1回	
		定植後(雑草発生前)						

●使用時にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。