

脱皮阻害型殺虫剤

カスタード[®]乳剤

©=BASF社の登録商標



特長

1. チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、ハエ目など幅広い害虫に効果!
2. 適用作物が広い。100種類以上の作物に使用可能!
3. 優れた残効性
4. 天敵類に影響が少ない
5. EU/台湾向けのお茶・りんごにも使用可能!



新規登録

■主な適用害虫



ナミハダニ コナガ ハスモンヨトウ チャノホノガ マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ オオタバコガ ハマキムシ類 ツマグロアオカスカミカメ ツマジロクサヨトウ

■適用害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

■使用方法：散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内
	キンモンホノガ ギンモンハモグリガ	2000~4000			
	ハマキムシ類	2000~6000			
	ヨモギエダシャク	4000			
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000		収穫21日前まで	
	ハダニ類	2000			
もも	ハマキムシ類	4000		収穫7日前まで	
	モモハモグリガ	2000~4000			
小粒核果類	ケムシ類	4000		収穫3日前まで	
ネクタリン	ハダニ類	2000			
	ハマキムシ類	4000			
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000	収穫7日前まで		
	ヨモギエダシャク	4000			
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000~4000	収穫14日前まで		
	ミカンハダニ	1000~2000			
	カキノハタムシガ ケムシ類 ハマキムシ類 カキクダアザミウマ	2000~4000			
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000	収穫7日前まで		
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000			
キャベツ	オオタバコガ コナガ アオムシ タマナギンウバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダランメイガ アザミウマ類	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内
	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000~4000			
	アオムシ コナガ ハイマダランメイガ	4000			
	コナガ	2000~4000			
	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000			
	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000~4000			
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000~4000	収穫14日前まで		
だいこん	アオムシ コナガ	2000~4000			
はつかだいこん	ハイマダランメイガ	4000	収穫7日前まで		
わさびだいこん	コナガ	2000~4000			
非結球あぶらな科葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内
	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000~4000			

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 ヨトウムシ	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
	レタス 非結球レタス くきちしゃ			オオタバコガ ヨトウムシ	収穫3日前まで
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	2000~4000		収穫前日まで	4回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ				
ミニトマト	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000		2回以内	
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000			
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~4000			
なす	マメハモグリバエ ハダニ類	2000		4回以内	
	ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ	2000~4000			
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000		3回以内	
ししとう	オオタバコガ	2000			
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000	収穫7日前まで	2回以内	
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	4000			
パセリ	ハスモンヨトウ	4000	1回		
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ	4000	収穫14日前まで	3回以内	
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000	収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	2回以内	
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000	収穫14日前まで	3回以内	
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類	4000	収穫前日まで	4回以内	
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000~4000 2000			

■適用害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

■使用方法:散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用用量	使用時期	使用回数	
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	
	シロイチモジトウ	4000				
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000~4000		収穫7日前まで	3回以内	
	タバココナジラミ類 (シルバーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000				
かぼちゃ	トマトハモグリバエ			2000	収穫前日まで	1回
うり類(漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	収穫3日前まで				
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ	2000		収穫前日まで	3回以内	
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで		
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000~4000		収穫前日まで	4回以内	
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000		2000	2回以内	
未成熟 とうもろこし	ツマジロクサヨトウ	2000				
	アウノメイガ	2000~4000				
てんさい	オオタバコガ	4000		1.6ℓ/10a*1	収穫7日前まで	4回以内
	ヨトウムシ	2000~4000				
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000				
	ヨトウムシ	1000				
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000		100~500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000		収穫7日前まで		
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000		100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000			収穫前日まで	
さやいんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000 2000				
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジトウ ハスモンヨトウ	4000	3000		2回以内	
未成熟さざげ 未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	4000				
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000				
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	4000	0.8ℓ/10a		収穫7日前まで	2回以内
	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000				

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用用量	使用時期	使用回数
みょうが (茎葉)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000	100~300ℓ/10a	みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあつては 開花期終了まで	3回以内
みょうが (花穂)*3				収穫前日まで	
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く)				収穫3日前まで	
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
にんじん	ヨトウムシ クロバネキノコバエ類				
タラゴン	ハスモンヨトウ				
つるむらさき				収穫前日まで	
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ	ハスモンヨトウ	2000	200~400ℓ/10a	収穫7日前まで	
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカシロシタバ			収穫3日前まで	
食用トレニア	ハスモンヨトウ	4000	200~400ℓ/10a	収穫14日前まで	
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ				
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000	200~400ℓ/10a	収穫7日前まで	
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ				
食用なでしこ	ハスモンヨトウ	4000	200~400ℓ/10a	収穫7日前まで	
食用パンダス	アザミウマ類				
食用さくら(葉)	アザミウマ類	4000	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで	
茶	チャノココクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメコバヤ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ				
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
ばら	ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ				
宿根かすみそう	シロイチモジトウ	4000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
スターチス	ハスモンヨトウ				
ソリダゴ	シロイチモジトウ ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
宿根アスター	シロイチモジトウ				
はぼたん	コナガ				
けいと	シロオビノメイガ				
カーネーション ほおすき	タバコガ	4000	100~700ℓ/10a	—	3回以内
りんどう	リンドウホソハマキ				

- *1 てんさいの使用方法: 無人航空機による散布
- *2 だいずの使用方法: 無人航空機による散布
- *3 みょうが(花穂)の使用方法: 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は農場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

このチラシの記載内容は2021年6月現在のものです。

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660
https://crop-protection.basf.co.jp/



詳細はWEBでも
ご覧いただけます。