

## 殺虫剤

# カスケード<sup>®</sup>乳剤

殺虫剤分類 **15**

有効成分

フルフェノクスロン ..... 10.0%

補助成分

メチルナフタレン(PRTR・1種) ..... 15.9%

®=BASF社の登録商標

登録番号：第18500号

性 状：黄色澄明可乳化  
油状液体

毒 性：普通物\*

危 険 物：三石・非水溶性・Ⅲ

有効年限：5年

包 装：250ml×20本  
500ml×20本



\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用害虫と使用方法

(2021年6月23日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000～ 4000倍					
	ハマキムシ類	2000～ 6000倍					
	ヨモギエダシャク	4000倍					
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍					
	ハダニ類	4000倍					
もも	ハマキムシ類	4000倍					
	モモハモグリガ	2000～ 4000倍					
小粒核果類	ケムシ類	4000倍		収穫21日 前まで			
ネクタリン	ハダニ類	2000倍					
	ハマキムシ類	4000倍					
おうとう	モモハモグリガ	2000～ 4000倍	収穫7日 前まで				
	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヨモギエダシャク	4000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000～4000倍					
	ミカンハダニ	1000～2000倍					
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類 ハマキムシ類 カキクダアザミウマ	2000～4000倍		収穫14日前まで			
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで				
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000倍	収穫30日前まで				
キャベツ	オオタバコガ コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ						
だいこん	アオムシ コナガ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
はつかだいこん	ハイマダラノメイガ						
わさびだいこん	コナガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球 あぶらな科 葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000倍					
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 ヨトウムシ	4000倍					
レタス 非結球レタス くきちしゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
				収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数			
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内			
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～ 4000倍								
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍								
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍			2000～ 4000倍			2回以内	4回以内	4回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000倍								
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍								
なす	マメハモグリバエ ハダニ類	2000～ 4000倍			4回以内			4回以内	4回以内	
	ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ									
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000倍			3回以内			3回以内	3回以内	
ししとう	オオタバコガ	2000倍								
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000倍	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内					
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く)	ハスモンヨトウ					1回	1回			
パセリ			3回以内	3回以内						
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ									
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000倍	収穫7日 前まで 但し、伏せ 込み栽培 は伏せ込 み前まで	2回以内	2回以内					
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000倍	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内					
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類		収穫前日 まで	4回以内	4回以内					
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍								
	ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000倍								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	4回以内	散布	4回以内
	シロイチモジヨトウ	4000倍					
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍		収穫前日 まで	3回以内		3回以内
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ						
かぼちゃ	トマトハモグリバエ			収穫前日 まで			
うり類 (漬物用) (しろうり、と うがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍		収穫3日 前まで	1回		1回
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日 まで			
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日 前まで	3回以内		3回以内
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～ 4000倍		収穫前日 まで	4回以内		4回以内
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000倍					
未成熟 とうもろこし	ツマジロクサヨトウ	2000倍					
	アワノメイガ	2000～ 4000倍		2回以内	2回以内		
	オオタバコガ	4000倍					
てんさい	ヨトウムシ	2000～ 4000倍		収穫7日 前まで	4回以内	無人航空機 による散布	
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000倍					
	ヨトウムシ	1000倍	25ℓ /10a				
	ヨトウムシ シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	32～ 64倍	1.6ℓ /10a				
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000倍		収穫3日 前まで	3回以内		3回以内	
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000倍		収穫前日 まで	2回以内		無人航空機 による散布	2回以内
さやいんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000倍 2000倍						
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000倍						
未成熟ささげ 未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	3000倍						
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類							
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	4000倍 32倍		0.8ℓ /10a	収穫7日 前まで			
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000倍						
みょうが (莖葉)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍		100～ 300ℓ /10a	みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで		3回以内	散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
みょうが (花穂)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍		収穫前日 まで	3回以内	散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する	3回以内
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く)	ハスモンヨトウ	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで	2回以内	散布	2回以内
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ			収穫前日 前まで			
にんじん	ヨトウムシ クロバネキノコバエ類			収穫7日 前まで			
タラゴン	ハスモンヨトウ			収穫前日 まで			
つるむらさき				収穫7日 前まで			
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ				収穫3日 前まで			
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ			2000倍			
食用トレニア	ハスモンヨトウ	2000倍	収穫14日 前まで				
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで			
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで			
食用なでしこ 食用ペンタス	ハスモンヨトウ	4000倍	200～ 400ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
食用さくら (葉)	アザミウマ類			200～ 700ℓ /10a			
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ	4000倍	200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	—	3回以内	散布	3回以内
ばら	ハダニ類	1000倍					
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000倍					
スターチス	ハスモンヨトウ	2000倍					
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ						
宿根アスター	シロイチモジヨトウ						
はぼたん	コナガ						
けいとう	シロオビノメイガ						
カーネーション ほおずき	タバコガ						
りんどう	リンドウホソハマキ	4000倍	100～ 700ℓ /10a				