

殺虫剤

カスケード[®]乳剤

殺虫剤分類 **15**

有効成分

フルフェノクスロン 10.0%

補助成分

メチルナフタレン(PRTR・1種) 15.9%

®=BASF社の登録商標

登録番号：第18500号

性 状：黄色澄明可乳化
油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：三石・非水溶性・Ⅲ

有効年限：5年

包 装：250ml×20本
500ml×20本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用害虫と使用方法

(2021年11月24日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数				
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000～ 4000倍									
	ハマキムシ類	2000～ 6000倍									
	ヨモギエダシャク	4000倍									
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍		200～ 700ℓ /10a				収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハダニ類	2000倍									
もも	ハマキムシ類	4000倍		200～ 700ℓ /10a				収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	モモハモグリガ	2000～ 4000倍									
	ハダニ類	2000倍									
ネクタリン	ハダニ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫21日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	ハマキムシ類	4000倍									
	モモハモグリガ	2000～ 4000倍									
小粒核果類	ケムシ類	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000倍						収穫7日 前まで			

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヨモギエダシャク	4000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000～4000倍					
	ミカンハダニ	1000～2000倍					
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類 ハマキムシ類 カキクダアザミウマ	2000～4000倍		収穫14日前まで			
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで				
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000倍	収穫30日前まで				
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ アザミウマ類 オオタバコガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
	16～24倍	0.8～1.6ℓ/10a					
	32倍	1.6～3.2ℓ/10a					
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
	16～24倍	0.8～1.6ℓ/10a					
	32倍	1.6～3.2ℓ/10a					
だいこん	アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
	16～24倍	0.8～1.6ℓ/10a					
	32倍	1.6～3.2ℓ/10a					
はつかだいこん		4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
わさびだいこん	コナガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
非結球 あぶらな科 葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～ 4000倍		収穫21日 前まで	3回以内		3回以内	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 ヨトウムシ	4000倍		収穫7日 前まで	2回以内		2回以内	
レタス 非結球レタス くきちしゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ			収穫3日 前まで	3回以内		3回以内	
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類			2000～ 4000倍	4回以内		4回以内	4回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000倍						
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍						
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍		2回以内	収穫前日 まで		2回以内	2回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～ 4000倍						
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍						
なす	マメハモグリバエ ハダニ類	2000～ 4000倍		4回以内	4回以内		4回以内	4回以内
	ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ							
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000倍		3回以内	3回以内		3回以内	3回以内
ししとう	オオタバコガ	2000倍						
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000倍	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内		
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く) ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ 食用なでしこ 食用ペンタス	ハスモンヨトウ							
パセリ							1回	1回
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ						3回以内	3回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで 但し、伏せ 込み栽培 は伏せ込 み前まで	2回以内	散布	2回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000倍		1.6ℓ /10a 3.2ℓ /10a	収穫14日 前まで		3回以内
	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	32倍					
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍					
	ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000倍					
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000～ 4000倍					
	シロイチモジヨトウ	4000倍					
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍	2000倍	収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ						
かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16倍	0.8ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
		16～ 32倍	1.6ℓ /10a				
		32～ 64倍	3.2ℓ /10a				
うり類 (漬物用) (しろうり、と うがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで	1回	散布	1回
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日 まで			
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日 前まで	3回以内		3回以内
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類			2000～ 4000倍	収穫前日 まで		4回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数		
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内		
未成熟とうもろこし	ツマジロクサヨトウ			25ℓ/10a	収穫7日前まで		2回以内	4回以内	2回以内
	アワノメイガ	2000～4000倍							2回以内
	オオタバコガ	4000倍							2回以内
てんさい	ヨトウムシ	2000～4000倍	1.6ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	無人航空機による散布	4回以内		
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000倍							
	ヨトウムシ	1000倍							
	ヨトウムシ シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	32～64倍							
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍	100～500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで					
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000倍		収穫3日前まで	3回以内	3回以内			
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内		散布	2回以内	
さやいんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000倍 2000倍							
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
未成熟ささげ つるむらさき	ハスモンヨトウ								
未成熟ふじまめ								3000倍	
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000倍							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ ツメクサガ	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
		32倍	0.8ℓ /10a			無人航空機 による散布	
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a			散布	
		16～ 32倍	0.8ℓ /10a				
		32～ 64倍	1.6ℓ /10a				
みょうが (莖葉)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで	散布	3回以内	
みょうが (花穂)				収穫前日 まで	散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィルム 被覆によ り散布液 が直接花 穂に飛散 しない状 態で使用 する		
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く) タラゴン 食用トレニア	ハスモンヨトウ	4000倍		収穫3日 前まで	2回以内	散布	2回以内
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ						
にんじん	ヨトウムシ クロバネキノコバエ類						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
		16～ 32倍	0.8ℓ /10a			無人航空機 による散布	
		32～ 64倍	1.6ℓ /10a				
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで	2回以内	2回以内	
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000倍		収穫14日 前まで			
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍		収穫7日 前まで			
食用さくら (葉)	アザミウマ類	4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ		200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで			
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	—	3回以内	散布	3回以内
ばら	ハダニ類	1000倍					
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000倍					
スターチス	ハスモンヨトウ	2000倍					
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ						
宿根アスター	シロイチモジヨトウ						
はぼたん	コナガ						
けいとう	シロオビノメイガ						
カーネーション ほおずき	タバコガ						
りんどう	リンドウホソハマキ	4000倍	100～ 700ℓ /10a				