

脱皮阻害型殺虫剤

カスタード[®]乳剤

©=BASF社の登録商標



特長

1. チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、ハエ目など幅広い害虫に効果!
2. 適用作物が広い。100種類以上の作物に使用可能!
3. 優れた残効性
4. 天敵類に影響が少ない
5. EU/台湾向けのお茶・りんごにも使用可能!



■適用害虫と使用方法 (色文字が2021年6月以降の適用拡大部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用回数
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000	200~ 700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000~ 4000			
	ハマキムシ類	2000~ 6000			
	ヨモギエダシャク	4000			
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000			
	ハダニ類	4000			
もも	ハマキムシ類	4000			
	モモハモグリガ	2000~ 4000			
ネクタリン	ハダニ類	2000			
	ハマキムシ類	4000			
小粒核果類	モモハモグリガ	2000~ 4000			
	ケムシ類	4000			
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000			
かんきつ	ヨモギエダシャク	2000~ 4000			
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ				
	ミカンハダニ		1000~ 2000		
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類 ハマキムシ類 カクダアザミウマ	2000~ 4000			
	マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000		
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000			
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギノウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダランメイガ アザミウマ類 オオタバコガ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内
		16~ 24*1	0.8~ 1.6ℓ /10a*1		
		32*1	1.6~ 3.2ℓ /10a*1		
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内
		16~ 24*1	0.8~ 1.6ℓ /10a*1		
		32*1	1.6~ 3.2ℓ /10a*1		
だいごん	アオムシ コナガ ハイマダランメイガ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内
		16~ 24*1	0.8~ 1.6ℓ /10a*1		
		32*1	1.6~ 3.2ℓ /10a*1		
はつかだいごん		4000		1回	
わさびだいごん	コナガ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内
非結球あぶらな 科葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000		収穫7日前まで	2回以内

■使用方法: 散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用回数		
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫21日前まで	3回以内		
	ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 ヨトウムシ		4000	収穫7日前まで	2回以内	
レタス 非結球レタス くきちしゃ		4000		収穫3日前まで	3回以内		
トマト		ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類		4000	4回以内	収穫前日まで	
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~ 4000					
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000					
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000		2回以内	収穫前日まで		
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~ 4000					
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000					
なす	マメハモグリバエ ハダニ類	2000~ 4000		4回以内	収穫前日まで		
	ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ	2000~ 4000					
	ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000				
ししとう	オオタバコガ	2000	3回以内				
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ						
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く) ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ 食用なでしこ 食用ペンタス	ハスモンヨトウ	4000	2回以内	収穫7日前まで	2回以内		
						パセリ	1回
						セルリー	3回以内
みつば	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ		3回以内	収穫14日前まで	3回以内		
	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000	2回以内	収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培 は伏せ込み前まで	2回以内		
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000	3回以内	収穫14日前まで	3回以内		
	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	32*1				1.6ℓ /10a*1	
		64*1				3.2ℓ /10a*1	
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類	4000					
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内		
	ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000					

*1 使用方法: 無人航空機による散布

■適用害虫と使用方法 (色文字2021年6月以降の適用拡大部分)

■使用方法:散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内
	シロイチモジヨトウ	4000			
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000~4000	2000	収穫7日前まで	3回以内
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000			
かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16*1	0.8ℓ/10a*1	収穫前日まで	3回以内
		16~32*1	1.6ℓ/10a*1		
		32~64*1	3.2ℓ/10a*1		
うり類(漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	1回
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで	
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで	
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000		収穫前日まで	4回以内
未成熟 とうもろこし	ツマジロクサヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
	アワノメイガ	2000~4000			
てんさい	オオタバコガ	4000	25ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内
	ヨトウムシ	2000~4000			
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000			
アスパラガス	ヨトウムシ	1000	100~500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000			
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000			
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
さやいんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000			
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
未成熟ささげ つるむらさき	ハスモンヨトウ	3000			
未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	3000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000			

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ ツメクサガ	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
		32*1	0.8ℓ/10a*1		
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
		16~32*1	0.8ℓ/10a*1		
		32~64*1	1.6ℓ/10a*1		
みょうが ¹ (莖葉)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000	100~300ℓ/10a	みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあっては 開花期終了まで	3回以内
みょうが ² (花穂)*2				収穫前日まで	
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く) タラゴン 食用トレニア	ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ				
にんじん	ヨトウムシ クロバネキノコバエ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ				
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	2000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000			
食用ざく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
食用さくら(葉)	アザミウマ類	2000			
茶	チャノココクモンハマキ チャノホンガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ	4000	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内
	きく ガーベラ			マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	
ばら	ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	1000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000			
スターチス	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ				
宿根アスター	シロイチモジヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
はばたん	コナガ				
けいとう	シロオビノメイガ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内
カーネーション ほおずき	タバコガ				
りんどう	リンドウホソハマキ	4000	100~700ℓ/10a	—	3回以内

*1 使用方法:無人航空機による散布

*2 みょうが(花穂)の使用方法: 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660
https://crop-protection.basf.co.jp/



詳細はWEBでも
ご覧いただけます。

このチラシの記載内容は2022年2月現在のものです。