

# 適用拡大登録のご案内

令和 5 年 9 月

農林水産省登録

第 2 4 1 8 2 号

殺菌剤

## イントレックスフロアブル

フルキサピロキサド水和剤

令和 5 年 9 月 6 日付けで、以下のとおり適用拡大登録されました。

- ・ 作物名「小麦」に適用病害虫名「雪腐大粒菌核病」、希釈倍数 1000~1500 倍」が追加されました。
- ・ 作物名「小麦」に適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「2000 倍」が追加されました。

### 【追加事項（太字下線部）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7ヶ所 <sup>※</sup> 7ヶ所 <sup>※</sup> を含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病、 雪腐小粒菌核病、 <b>雪腐大粒菌核病</b>	1000~1500倍	60~150 L/10a	根雪前	4回以内	散布	4回以内 (融雪後は 3回以内)
	赤さび病	2000倍	0.8 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	
	赤かび病	8~16倍				散布	
	<b>うどんこ病</b>	1000倍				散布	
	<b>うどんこ病</b>	<b>2000倍</b>	60~150 L/10a				
ばれいしょ	黒あざ病	150倍	—	植付前	1回	瞬時~ 10分間 種いも浸漬	1回
てんさい	根腐病 葉腐病	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内

\* 使用上の注意事項及び水産動植物に関する注意事項が追加されました。

#### 【使用上の注意事項：追加】

- ・ 小麦のうどんこ病に使用する場合、発病後の散布では効果が劣ることがあるので、予防的に散布すること。

#### 【水産動植物に関する注意事項：追加】

- ・ 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。  
使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。