

令和 5 年 11 月

農林水産省登録
第 23292 号

適用拡大登録のご案内

殺菌剤

セルカディスフロアブル

令和 5 年 11 月 22 日付けで、以下のとおり変更登録されました。

- ・作物名「日本芝」の適用病害虫名「葉腐病(ラジパッチ)」、「カブライア葉枯病」、「ダラスポット病」及び「疑似葉腐病(象の足跡)」に使用方法「無人航空機による散布」が追加されました。

【変更後：太字下線部】 (変更に該当する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7月1日~10月31日を含む農薬の総使用回数		
日本芝	葉腐病 (ラジパッチ)	400~800 倍	200mL/m ²	発病初期	4回以内	散布	4回以内		
		2000 倍	500mL/m ²			無人航空機による散布			
		6.4 ~12.8 倍	3.2mL/m²						
	3.2~6.4 倍	1.6 mL/m²	散布						
	フェアリーリング病	800 倍	200mL/m ²			カブライア葉枯病		4回以内	4回以内
	カブライア葉枯病	400 倍	100mL/m ²						
		2000 倍	500mL/m ²	無人航空機による散布					
		12.8 倍	3.2mL/m²						
	6.4 倍	1.6 mL/m²	ダラスポット病	4回以内	4回以内				
	3.2 倍	0.8 mL/m²				散布			
	666 倍	200mL/m ²				無人航空機による散布			
	10.6 倍	3.2mL/m²							
	5.3 倍	1.6 mL/m²							
	2.6 倍	0.8 mL/m²	立枯病 (グイアデクライン)	発病前~ 発病初期	4回以内	4回以内			
	400~800 倍	200mL/m ²					散布		
1000 倍	500mL/m ²	無人航空機による散布							
疑似葉腐病 (象の足跡)	800 倍		200mL/m ²						
	12.8 倍		3.2mL/m ²						
	6.4 倍	1.6 mL/m²							
3.2 倍	0.8 mL/m²	疑似葉腐病 (春はげ症)	休眠期前	4回以内	4回以内				
800 倍	200mL/m ²					散布			
2000 倍	500mL/m ²								
初刈り後のス ポット病	400~800 倍	200mL/m ²	休眠期前 及び萌芽前	4回以内	4回以内				
	1000~2000 倍	500mL/m ²							

使用上の注意事項が追加されました。

○使用方法「無人航空機による散布」に伴う追加事項

本剤を無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意すること。

- ① 散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- ② 散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- ③ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- ④ 散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。

○使用方法「無人航空機による散布」に伴う「水産動植物に有毒な農薬については、その旨」追加事項

無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

——さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ——

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://turf-ornamentals.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

®=BASF社の登録商標