



芝生用殺菌剤

ザンプロターフ®

アメクトラジン水和剤

殺菌剤分類 45

成分

アメクトラジン……………18.9%
水、界面活性剤等……………81.1%

性状

類白色水和性粘稠懸濁液体

500 ml入

®=BASF社の登録商標

製造 BASFジャパン株式会社

本社 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
☎0120-014-660 <https://turf-ornamentals.basf.co.jp>

- ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届くところには置かない。
- 空容器は3回以上水洗し、ほ場などに放置せず、適切に処理する。●洗浄水はタンクに入れる。

⚠️安全使用上の注意

- 散布時は、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用し、薬剤が皮ふに付着しないよう注意。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(弱い刺激性)。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼で乾燥した所。

⚠️効果・薬害等の注意

- 使用前に、容器をよく振る(沈殿)。
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用する(耐性菌出現回避)。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



250 ml
(目安)

GP-24A

適用病害虫と使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アメクトラジンを含む農薬の総使用回数 |
|-----------------|--------------|-------|--------|------|---------|------|--------------------|
| 西洋芝 (ベントグラス) | 赤焼病 ビシウム病 | 200倍 | 0.1ℓ/㎡ | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | | 1000倍 | 0.5ℓ/㎡ | | | | |

製造場 BASFエスパニョーラ S.L. タラゴナ工場
スペイン王国 43006 タラゴナ カレテラ
N-340 km 1156

小分製造場 新富士化成薬株式会社
群馬工場 群馬県高崎市小八木町313
高崎工場 群馬県高崎市大八木町888

最終有効年月(西暦下2ケタ)