



芝生用殺菌剤

ピュアスター®フロアブル

メチルテトラプロール水和剤

Powered by Pavecto® Active

殺菌剤分類 11A

成分

メチルテトラプロール……………9.7%  
水、界面活性剤等……………90.3%

性状

類白色～淡黄色水和性粘稠懸濁液体



®=BASF社の登録商標

製造 BASFジャパン株式会社

本社 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
☎0120-014-660 <https://turf-ornamentals.basf.co.jp>

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。  
●空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。●洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用する。

⚠安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗する(弱い刺激性)。
- 皮ふに付着しないよう注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(刺激性)。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用し保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。
- かぶれやすい人は作業に従事しないようにし、施用した作物などとの接触をさける。
- 夏期高温時の使用をさける。
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、使用中および使用後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

⚠効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(沈殿)。
  - 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
  - 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
  - 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
  - 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにする。
  - 使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意する。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 保管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管する。



適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルテトラプロールを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	炭疽病	200倍	100ml/m <sup>2</sup>	発病前～ 発病初期	3回以内	散布	3回以内
		1000倍	500ml/m <sup>2</sup>				

最終有効年月(西暦下2ケタ)

GP-24A

製造場 BASFエスパニョーラ S.L. タラゴナ工場  
スペイン王国 43006 タラゴナ カレテラ N-340 km 1156  
BASFサウスイーストアジア社 同社工場  
シンガポール共和国 トゥアス通り11

小分製造場 新富士化成薬株式会社 群馬工場  
群馬県高崎市小八木町313番地