

BASFテクニカルシート

■・BASF

We create chemistry

分野：芝生管理(芝生用殺菌剤)

製品：セルカディス フロアブル(500ml x 10本)

ラージパッチ&日本芝病害の総合殺菌剤であるセルカディス® フロアブルは立枯病(ゾイシアデクライン)やネクロティックリングスポット病等に高い効果があります!

近年、地球温暖化等の影響による異常気象により夏の記録的な高温や少雨などが発生しています。

(参考：気象庁 異常気象分析検討会 <https://www.jma.go.jp/jma/press/2509/05b/kentoukai20250905.html>)

このような高温や少雨・乾燥といった過酷な生育条件下では、暖地型芝である日本芝でもダメージが蓄積されて病害が発生しやすくなり、ゾイシアデクラインやネクロティックリングスポット病等の難防除病害が発生した場合、症状が激しく出たり、回復に相当の時間を要する場合があります。これらの病害は発生してから気付くことが多く、予防策が取りにくいいため、発見次第、早期に効果の高い殺菌剤を散布することが重要です。こういう場合には、ゾイシアデクラインやネクロティックリングスポット病等の日本芝の難防除病害に高い効果を持つセルカディス フロアブルがおすすめです。



国土交通省
ホームページ

セルカディス® フロアブルの特長



- ゾイシアデクラインやネクロティックリングスポット病等の日本芝に発生する難防除病害に高い効果あり
- ラージパッチ、カーブラリア葉枯病、春はげ症、象の足跡、フェアリーリング病等の幅広い病害にも有効

セルカディス フロアブルの上手な使い方~

- ✓ 難防除病害に対しては、基本的に秋処理メインで
薬剤処理を行うのがおすすめです ⇒ **秋の予防散布が重要**
- ✓ 常発地では2回処理(1ヶ月間隔)が有効
- ✓ 春になって病徴が目につく場合、春処理をすることで病徴が緩和され芝の回復が早くなります

セルカディス フロアブルの試験事例(ネクロティックリングスポット病)

◆ フェアウェイ(兵庫県内ゴルフ場)



セルカディス フロアブル の試験事例(ゾイシアデクライン)

〈試験目的〉ゾイシアデクラインに対する効果確認
〈試験地〉兵庫県内ゴルフ場 No.6 ティーイングエリア
〈対象病害発生状況〉中発生
〈芝種〉コウライシバ
〈土性〉埴壌土
〈処理日〉10月21日、11月18日(2回処理)
〈調査日〉翌年4月14日(2回目散布後147日後)
〈調査方法〉1.試験区内を対象にパッチ面積率を算出した。
2.防除価はパッチ面積率の平均値より求めた。

～試験結果～

試験薬剤	薬量 散布水量	パッチ面積率 (%)	防除価	薬害
セルカディス フロアブル	0.3ml/m ² 200ml/m ²	6.7	80	なし
対照剤	0.3ml/m ² 200ml/m ²	11.7	65	なし
無処理	—	33.3	—	—

対照剤に勝る
効果が
認められた。



本剤は対照剤と比べて高い効果を示した。

無処理と比べて高い防除効果があり、実用性が高いことが確認された。

