

**BASF**  
We create chemistry

芝生用殺菌剤

# エボリティ® フロアブル

フルキサピロキサド・メフェントリフルコナゾール水和剤

Powered by Xemium® & Revysol® Active

殺菌剤分類 **7, 3**

成分

フルキサピロキサド……………17.4%  
メフェントリフルコナゾール……………17.4%  
水、界面活性剤等……………65.2%

性状

類白色～淡褐色水和性粘稠懸濁液体

®=BASF社の登録商標

製造 **BASFジャパン株式会社**

本社 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
☎0120-014-660 <https://turf-ornamentals.basf.co.jp>

500mℓ入

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。●洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場などで使用する。

## 安全使用上の注意

- アレルギー性反応を起こすおそれがある。
- 公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、入畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

## 農薬使用者への被害防止方法

(調製時)  
西洋芝(ペントグラス)、西洋芝(パーミュダグラス)：  
不浸透性手袋

## 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさげ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する薬液にかからないようにする。
- 使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

保管…食品と区別して、直射日光のあたらない低温な場所に密栓して保管する。



4

250  
mℓ

(目安)

## 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	フルキサピロキサド を含む農薬の 総使用回数	メフェントリフル コナゾールを含む 農薬の総使用回数	被害 防止方法 使用者
西洋芝 (ペントグラス)	炭疽病 ダラススポット病 葉腐病 (ブラウンパッチ) フェアリーリング病	1000 倍	500mℓ /㎡	発病前～ 発病初期	3回 以内	散布	4回以内	3回以内	
		200 倍	100mℓ /㎡						
西洋芝 (パーミュダ グラス)	カーブラリア葉枯病 フェアリーリング病	1000 倍	500mℓ /㎡						
		200 倍	100mℓ /㎡						

製造場 **BASFサウスイーストアジア社 同社工場**  
シンガポール共和国トアス通り11

小分製造場 **新富士化成薬株式会社**  
群馬工場 群馬県高崎市小八木町313番地  
高崎工場 群馬県高崎市大八木町888番地

GP-26A

最終有効年月(西暦下2ケタ)